

# JORNAL da CIÊNCIA

Órgão da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência



HOME

NOTÍCIAS

ÚLTIMAS EDIÇÕES

SERVIÇOS

LINKS

## Edição impressa

► JC 630, de 26/09/08



► Charges



► Veja mais

## Notícias

Sexta-Feira, 26 de setembro de 2008

**JC e-mail 2864, de 28 de Setembro de 2005.**

### Conexão trófica

Pesquisa revela o papel fundamental do ameaçado caranguejo-uçá na reciclagem dos nutrientes no mangue. O estudo também dá subsídios para que a espécie possa começar a ser criada em cativeiro

Eduardo Geraque escreve para a "Agência Fapesp":

As conseqüências de uma queda de conexão na internet são sempre desagradáveis para os usuários. Em um manguezal, segundo acaba de revelar um estudo recém-concluído na Universidade Estadual Paulista (Unesp), esses processos de causa e efeito apresentam conseqüências parecidas. A conexão, nesse caso, é o caranguejo-uçá (*Ucides cordatus*).

"Descobrimos que esse crustáceo desempenha um papel fundamental na reciclagem dos nutrientes dentro do mangue", disse Ronaldo Christofolletti, autor de uma tese de doutorado sobre o tema.

Hoje ligado à Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), o pesquisador desenvolveu seu trabalho sob a orientação de Marcelo Pinheiro, professor da Unesp no campus de São Vicente.

O fluxo nutritivo criado pelo caranguejo-uçá, espécie bastante explorada comercialmente, principalmente nos mangues do Nordeste do Brasil, começa dentro da toca do animal. "Ele leva as folhas para lá e faz o processo de trituração", explica Christofolletti.

Os nutrientes não ficam restritos aos elos da cadeia ecológica presentes naquele ambiente. "Do mangue, são exportados principalmente para o ambiente marinho. São consumidos, por exemplo, por larvas de camarões e por outros caranguejos e moluscos", conta Christofolletti.

Por causa dessas várias ligações ecológicas, a ausência do caranguejo-uçá traria sérias conseqüências aos usuários finais do fluxo de nutrientes.

Por se tratar de uma espécie de alto valor econômico, os subsídios oferecidos pelo estudo realizado em manguezais protegidos no município de Iguape, no litoral sul de São Paulo, ganham ainda mais importância.

O pesquisador identificou também o impacto da alimentação disponível para o crescimento de cada um dos indivíduos.

"Percebemos que em bosques onde predomina a planta *Rhizophora mangle* a disponibilidade de nutrientes, tanto nas folhas como no solo, é maior. Nesses ambientes, ao contrário do que ocorre em bosques de *Laguncularia racemosa*, o crescimento dos animais é maior", disse.

Essa outra descoberta, explica Christofolletti, poderá ajudar o desenvolvimento de um método de criação em cativeiro do caranguejo-uçá.

Essas espécies demoram até oito anos para ter valor comercial na

## Anterior

Hawking reedita sua obra e diz que agora ela está mais simples

## Próxima

Cabelo em camundongo careca

## Índice de Notícias

📄 - imprimir

✉ - enviar

✍ - comentário

natureza, explica o cientista. Como a exploração aumenta a cada dia, é importante tentar criar o caranguejo-uçá em cativeiro, para que, pressão antrópica contra a espécie possa diminuir.

“Com esse conhecimento ecológico mais detalhado sobre a alimentação, pode-se, por exemplo, pensar em desenvolver uma espécie de ração para o animal”, aponta o pesquisador.

Essa iniciativa pode ser a única a fazer com que a conexão natural, existente dentro dos manguezais, continue a funcionar.  
(Agência Fapesp, 28/9)

**Expediente • Contato • Site da SBPC**

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC©2002  
Todos os direitos reservados / All rights reserved

Navegue por aqui

Selecione